Patientinformation

Salvebehandling af forhudsforsnævring



www.friklinikkenregionsyddanmark.dk

Ambulatoriet

Friklinikken

Region Syddanmark




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Forhudsforsnævring

Forhudsforsnævring (phimosis) er en forsnævring af forhuden, som kan føre til problemer med urinering og infektioner under forhuden.

Baggrund

Flere videnskabelige undersøgelser herunder danske har vist, at man kan behandle børn med forhudsforsnævring (Fig. 1) med påsmøring af binyrebarkhormon-creme og hermed undgå operation.
Resultaterne viser, at ca. 2/3 af børnene opnår et fuldt tilfredsstillende resultat, hvor forhuden kan trækkes tilbage uden besvær. Der er i de samme undersøgelser ikke observeret nogen bivirkninger ved behandlingen, og behandlingen påvirker ikke børnenes egen produktion af binyrebarkhormon.

Behandling

Der behandles med cremen Diproderm 0,05 %, som påsmøres 2 gange dagligt i 4 uger.

Påsmøring

Forhuden strammes let op (Fig. 2), således at den forsnævrede del af forhuden tydeligt ses. Herefter påsmøres et tyndt lag creme fra spidsen af forhuden til der, hvor kanten af penishovedet aftegnes gennem forhuden (Fig. 3). Efter 2 ugers behandling trækkes forhuden længere og længere tilbage. Tilbagetrækningen skal helst udføres flere gange dagligt.

Hvis forhuden trækkes helt tilbage over penishovedet, skal man være opmærksom på, at forhuden igen trækkes på plads for at undgå hævelse af penishovedet og forhuden. Denne hævelse kan umuliggøre, at forhuden kan komme på plads.

Undgå påsmøring af hormoncremen på penishovedet. Vi anbefaler almindelig håndvask efter påsmøring.

Behandling med hormoncreme må ikke fortsætte ud over de 4 uger. Efter 4 uger vil barnet komme til kontrol hos egen læge, hvor behandlingsresultatet vurderes. Hvis foruden fortsat er generende snæver henvises barnet til vurdering med henblik på operation.

Kontakt

Har du spørgsmål eller er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at ringe til en sygeplejerske. Ring 7690 8350 mellem kl. 9.00-15.00.

Friklinikken, Region Syddanmark
Agerbølvej 2B,
7323 Give
Telefon 7690 8350

Mail: friklinikken@slb.regionsyddanmark.dk

Scan koden og besøg vores hjemmeside
- her finder du mere information.

Friklinikken RSD, rev. feb. 2012

812919

Region Syddanmark